

## **In Zweden is er een duidelijk verband tussen psychotische ervaringen in de adolescentie met middelenverslaving en/of suïcidaal gedrag op latere leeftijd**

Psychotische ervaringen (hallucinaties en wanen) komen bij ongeveer 7% van de adolescenten (en volwassenen) voor. Uit de literatuur komt naar voren dat adolescenten met psychotische ervaringen meer risico lopen op het ontwikkelen van middelenverslaving en suïcidaal gedrag. In dit Zweedse cohortonderzoek werden data uit de Zweedse Child and Adolescent Twin Study (CATTS) (n=9242) gekoppeld aan het Zweedse National Patient Register (NPR). De deelnemers zijn tussen 1994 en 1999 geboren en hebben op 15- en/of 18-jarige leeftijd een vragenlijst ingevuld waarbij gevraagd werd naar auditieve of visuele hallucinaties en vijf soorten wanen (CATSS-15; CATSS-18). In het National Patient Register staan alle door medici toegekende diagnoses (ICD-10 codes). Met behulp van Cox regressie analyses werden de associaties, uitgedrukt in hazard ratios (HR), uitgerekend tussen de scores op psychotische ervaringen in de CATSS en diagnoses in het NPR. Hieruit blijkt dat alle type psychotische ervaringen worden geassocieerd met een middelenverslaving en/of suïcidepogingen op latere leeftijd met HR's van 1.6 tot 3.0. Er werd ook een dosis-response verband gevonden tussen het aantal psychotische ervaringen in de adolescentie en de kans om later verslaafd te worden of een suïcidepoging te doen. Adolescenten die hallucinaties en wanen rapporteren hebben een bovenmatige kans om later diagnoses te krijgen voor middelenmisbruik en/of suïcidepoging. Voor behandelaars is het meten en monitoren van psychotische ervaringen bij adolescenten van belang.

*Cederlöf, M., Kuja-Halkola, R., Larsson, H., Sjolander, A., Ostberg, P., Lundstrom, S., Kelleher, I., & Lichtenstein, P. (2016). A longitudinal study of adolescent psychotic experiences and later development of substance use disorder and suicidal behavior. Schizophr Res.*