

Cotter J, Drake RJ, Bucci S, Firth J, Edge D & Yung AR (2014). What drives poor functioning in the at-risk mental state? A systematic review. Schizophrenia Research 159 (2-3): 267-277. Trefwoord: UHR

Systematische review: blijvende functionele handicaps bij mensen met een At-Risk Mental State (ARMS) worden voorspeld door negatieve symptomen, desorganisatie en neurocognitieve gebreken

Mensen die kwetsbaar zijn om een psychose te ontwikkelen worden vaak beschreven met begrippen als UltraHoog Risico (UHR) of At-Risk Mental State (ARMS). Het wordt steeds duidelijker dat mensen met ARMS slecht blijven functioneren ongeacht of ze al dan niet een psychose ontwikkelen. In deze Britse systematische review werd onderzocht welke specifieke factoren worden geassocieerd met of voorspellend zijn voor de functionele handicaps bij mensen met ARMS. Functioneren werd opgevat als uitkomsten van meetinstrumenten die de frequentie van, de kwaliteit van en/of de satisfactie met sociale, academische en werkgerelateerde activiteiten in kaart brengen. In de geïncludeerde 72 observationele- of interventie-studies werd vaak gebruik gemaakt van de Global Assessment of Functioning (GAF) en de Social and Occupational Functioning Assessment Scale (SOFAS). Uit de cross-sectionele studies komt een duidelijke associatie naar voren tussen negatieve symptomen en/of neurocognitieve beschadiging en het slecht blijven functioneren. Uit de longitudinale studies hebben de volgende factoren een voorspellende waarde op het slechte functioneren: negatieve symptomen, desorganisatie en neurocognitieve gebreken. Uit de interventiestudies bleek dat noch psychofarmaca noch cognitieve gedragstherapie zichtbare effecten hadden op het (sociale) functioneren. Een betere sociale cognitie hield significant verband met beter sociaal functioneren. De ARMS-patiënten vormen geen homogene groep: slechts een minderheid ontwikkelt een psychotische stoornis. Afgezwakte psychotische symptomen kunnen verschillende ontstaansgronden hebben. Negatieve symptomen, desorganisatie en cognitieve gebreken manifesteren zich al voordat de positieve symptomen zich voordoen.