

DeVylder JE, Hilimire MR. (2015). *Screening for psychotic experiences: social desirability biases in a non-clinical sample. Early Intervention in Psychiatry. 9 (4), 331-4.*

Trefwoorden: *Psychotische symptomen*

Studenten die sociaal wenselijke antwoorden geven, rapporteren minder snel eventuele subklinische psychotische ervaringen

(Subklinische) psychotische ervaringen vinden op een continuüm plaats in de algemene bevolking, waarbij het grootste deel van de psychotische ervaringen nooit voldoet aan criteria voor schizofrenie of psychotische stoornis. Omdat psychose met stigma geassocieerd wordt, kan het geven van sociaal wenselijke antwoorden onderzoeken, waarbij psychotische ervaringen met behulp van zelfrapportage worden gescreend, beïnvloeden. In dit Amerikaanse onderzoek (n=686; hoger onderwijs studenten) werd de hypothese getest dat personen die sociale wenselijk antwoorden geven minder geneigd zijn psychotische ervaringen te rapporteren. Sociale wenselijkheid werd gemeten met de Marlowe-Crowne Social Desirability Scale, het risico op psychoses met behulp van een screeningsinstrument dat door Liu et al. is ontwikkeld en dat een 'vermeende pre-psychotische toestand' in beeld kan brengen. Gemeten werden: vermeende pre-psychotische toestand (algemeen), mate van achterdocht, betrekkingswaan, achtervolgingswaan en stemmen horen. Analyses werden met behulp van logistische regressiemodellen uitgevoerd. Het bleek dat de sociale wenselijkheidsscores significant lager waren voor respondenten die positief scoorden voor een vermeende pre-psychotische toestand in vergelijking met degenen die niet bevestigend scoorden op een van de schalen van het screeningsinstrument. Dat gold ook voor de wanen, maar niet voor de auditieve hallucinaties. Bij onderzoek moet er dus rekening worden gehouden dat psychotische ervaringen ondergerapporteerd worden.