

Kline E, Millman ZB, Denenny D, Wilson C, Thompson E, Demro C, Connors K, Bussell K, Reeves G, Schiffman J. (2016). Trauma and psychosis symptoms in a sample of help-seeking youth. *Schizophr Res.* 175(1-3):174-9.

Personen met psychotische symptomen hebben meer traumatische gebeurtenissen meegemaakt dan andere met psychische problemen

Het risico op psychoses wordt vergroot door negatieve gebeurtenissen zoals seksueel-, fysiek- en emotioneel misbruik, verwaarlozing, slachtoffer zijn van pesten door peers. In dit Amerikaanse onderzoek werd bekeken of patiënten met risico op psychose of volledige psychose (N=60; 12-22 jaar) al dan niet vaker trauma's hebben meegemaakt dan patiënten met andere psychische problemen (N=65; 12-22 jaar). Trauma's werden vastgesteld met de Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia, Present and Lifetime version (KSADS-PL); psychotische symptomen met de Structured Interview for Psychosis-Risk Syndromes (SIPS). Er werden tien gewelddadige (slachtoffer of getuige van (huiselijk) geweld; slachtoffer van seksueel of fysieke misbruik) en niet-gewelddadige trauma's (slachtoffer van auto ongeluk, brand, natuurramp of ander ongeluk) uitgevraagd. Alle deelnemers waren aangemeld bij twee vroege psychose klinieken voor een eerste screening. Volgens de SIPS-criteria vielen er 60 personen onder de categorie Klinisch Hoog Risico/Vroege Psychose (KHR/VP) en 65 hadden Laag Risico (LR) op psychose. Van de hele groep had 75% minstens één traumatische gebeurtenis meegemaakt. In de KHR/VP-groep (85%) was het deel dat minstens één traumatische gebeurtenis had meegemaakt veel groter dan in de LR-groep (65%). De KHR/VP-groep had significant meer trauma's dan de LR-groep (gemiddeld 2.02 versus 1.45). Alleen positieve symptomen hadden significante correlaties met traumatische gebeurtenissen. In de LR-groep was er een significante associatie tussen gewelddadige trauma's en een hoge mate van gevoelens van achterdocht. Bij de KHR/VP-groep werden gevoelens van grandiositeit voorspeld door gewelddadige én niet-gewelddadige trauma's.