

## **In Nederland verloopt het behandeltraject voor personen met een psychose die voor het eerst met de hulpverlening in aanraking komen voor etnische minderheden anders dan voor allochtone Nederlanders**

In deze Nederlandse studie wordt de hypothese getest dat personen met psychotische stoornissen uit een etnische minderheid een ander behandelingstraject in de ggz doorlopen dan etnische Nederlanders, maar dat er tussen de verschillende etnische groepen (Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen) ook weer grote verschillen in behandelingskenmerken zijn. Dit is onderzocht met gegevens uit het landelijke registratiesysteem ZORGIS van GGZ Nederland over de periode 2001-2005. In totaal ging het 23.122 unieke patiënten met 30.655 inschrijvingen in de genoemde periode. Er werd naar zes behandelkenmerken gekeken: 1. Lengte van de wachttijd (langer of korter dan 24 uur); 2. Lengte van de inschrijving, tussen inschrijving en laatste behandelcontact; 3. De mate van verwijzingen door derde partijen (huisarts, politie e.d.); 4. Mate van crisiscontacten; 5. Mate van klinische opnames; 6. Mate van gedwongen opnames. Qua behandelkenmerken blijken er grote verschillen tussen etnische minderheidsgroepen en tussen mannen en vrouwen. In vergelijking met de etnische Nederlanders werd een etnische minderheidsachtergrond meer geassocieerd met kortere wachttijden, meer verwijzingen door de politie, meer crisiscontacten, meer klinische opnames en meer gedwongen opnames. De verschillen tussen inschrijvingen en behandelkenmerken tussen Nederlandse en Turkse patiënten zijn klein. Vooral de Antillianen, en in mindere mate Surinamers, hebben een ongunstige positie wat betreft de behandeling van psychotische stoornissen. Voor een deel ligt dat eraan dat ze weinig kennis van de ggz hebben, slecht Nederlands spreken, schaamte en stigma voelen en omdat ze vaak via een gedwongen behandeling met de ggz in aanraking komen.

*Fassaert, T., Heijnen, H., de Wit, M.A., Peen, J., Beekman, A.T., & Dekker, J. (2016). The association between ethnic background and characteristics of first mental health treatment for psychotic disorders in the Netherlands between 2001 and 2005. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 51, (12) 1591-1601.*