

Bijna alle personen die bij een eerste psychose de diagnose schizofrenie krijgen, hebben die na 10 jaar nog steeds

Schizofreniespectrumstoornissen vormen een groep ziektes met één of meer van de volgende kenmerken: wanen, hallucinaties, gedesorganiseerd gedrag, abnormaal motorisch gedrag en negatieve symptomen. De belangrijkste stoornis in deze groep is schizofrenie. Een accurate diagnose bij mensen met een Eerste Psychotische Episode (EPE) is van belang voor de functionele en klinische uitkomsten. In deze Spaanse studie werd de stabiliteit van de schizofrenie-diagnose bij een cohort personen met EPE (N=209; niet-affectieve psychose) over een periode van 10 jaar onderzocht. Er werd gekeken wie een schizofrenie-diagnose 6 maanden na de instroom in het programma kreeg (baseline) en die 10 jaar lang behield en wie in de follow-up periode de diagnose schizofrenie kreeg, na eerst een andere diagnose te hebben gehad (prospectieve en retrospectieve stabiliteit). Dit is een secundaire analyse op basis van data van het vroege psychose programma PAFIP dat van 2001 tot 2008 liep. Met logistische regressie-analyses werd berekend welke factoren diagnostische instabiliteit voorspelden. Diagnoses werden met de Structured Clinical Interview for DSM-IV Disorders (SCID) vastgesteld. Per persoon werd de Duur van de Onbehandelde Psychose (DOP) vastgesteld en werden o.a. afgenomen: de Premorbid Adjustment Scale (PAS), de Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) en de Clinical Global Impression-Severity rating scale (CGI-S). Op baseline kregen van de 209 personen 126 de diagnose schizofrenie (60,3%), 17 korte psychotische stoornis (8,1%), 46 schizofreniforme stoornis (22%), 16 psychose NOS (7,7%). Na 10 jaar waren de diagnoses: 154 schizofrenie (73,7%), 10 korte psychotische stoornis (4,8%), 12 psychose NOS (5,7%), 12 schizofreniforme stoornis (5,7%), 19 schizoaffectieve stoornis (9,1%). 8 van de 126 personen die op baseline de diagnose schizofrenie hadden, hadden na 10 jaar een ander diagnose (prospectieve stabiliteit = 94%) en de voorspellers van die verandering waren een hogere PAS-score en een lagere CGI-S-score op baseline. Retrospectief hadden van de 154 personen die na 10 jaar de diagnose schizofrenie hadden, 34 op baseline een andere diagnose (retrospectieve stabiliteit = 77%). Deze groep had een kortere DOP en een betere sociaal-economische status.

Suárez-Pinilla P, Suárez-Pinilla M, Setién-Suero E, Ortiz-García de la Foz V, Mayoral-Van Son J, Vázquez-Bourgon J, Gómez-Revuelta M, Juncal-Ruíz M, Ayasa-Arriola R, Crespo-Facorro B. (2021) Stability of schizophrenia diagnosis in a 10-year longitudinal study on first episode of non-affective psychosis: Conclusions from the PAFIP cohort. Acta Psychiatr Scand. 2021 Oct;144(4):342-357.