

Björkenstam C, Björkenstam E, Hjern A, Bodén, R & Reutfors J (2014). Suicide in first episode psychosis: A nationwide cohort study. Schizophrenia Research 157 (1-3): 1-7. Trefwoord: Overige thema's

Bij personen die een Eerste Psychotische Periode (EPP) hebben doorgemaakt komt suïcide het vaakst voor bij de groep met Psychotische Depressie

Patiënten met een Eerste Psychotische Periode (EPP) lopen meer risico suïcide te plegen, vooral in de eerste fase van de psychotische stoornis. In deze nationale cohort studie van patiënten die tussen 1973 en 1978 in Zweden geboren zijn en tussen hun 15e en 30ste waren opgenomen met een EPP (n=2819), werd onderzocht hoeveel personen met EPP suïcide pleegden en wat de relatieve invloed van een aantal risicofactoren was. Er werd gebruik gemaakt van een aantal Zweedse bevolkingsregistraties: het medische geboorteregister, het nationale patiëntenregister, het doodsoorzakenregister, het register van veroordelingen, het Zweeds register van kinderen en jeugdigen, het overzicht van inkomens en het nationale schoolregister. De risicofactoren voor suïcide werden in 5 categorieën verdeeld: psychiatrische factoren, familiale factoren, sociale factoren, premorbide intellectueel functioneren en andere factoren. In totaal kwamen 121 EPP-patiënten door suïcide om het leven in de onderzochte periode (tot eind 2008). Per 1000 persoonsjaren was de Incidence Rate Ratio (IRR) op suïcide: 4,3 (95%BI: 3.5–5.0). Het grootste aantal suïcides kwam voor bij de diagnostische groepen Psychotische Depressie (IRR=7.8 per 1000 persoonsjaren) en Waanstoornis (Delusional Disorder): IRR=6.9 per 1000 persoonsjaren. De belangrijkste risicofactoren op suïcide zijn: eerder in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest wegens zelfbeschadiging (IRR=2.7), een familielid in de eerste lijn met schizofrenie of bipolaire stoornis hebben (IRR=2.1), veroordeeld zijn voor het plegen een gewelddadige misdaad (IRR=2.0) en een middelenverslaving hebben (IRR=2.0). Gemeenschappelijk bij de meeste van deze risicofactoren is een grote mate van impulsiviteit, wat ook geassocieerd wordt met het risico op suïcide.