

Trotta A, Di Forti M, Mondelli V, Dazzan P, Parientes C, David A, Mulè A, Ferraro L, Formica I, Murray, RM & Fisher HL (2013). Prevalence of bullying victimization amongst first-episode psychosis patients and unaffected controls. *Schizophrenia Research* 150 (1), 169-175. Trefwoord: Trauma

Personen met een psychotische stoornis zijn zeker twee maal zo vaak slachtoffer van pesten geweest dan de gemiddelde bevolking

Er is veel evidentie die erop wijst dat mensen die in hun kindertijd mishandeld zijn een veel groter risico op psychotische stoornissen hebben dan anderen. Of dit verband ook bestaat bij Eerste Psychotische Episode (EPE)-patiënten die het slachtoffer zijn geweest van ernstige pesterijen en mishandeling (*bullying*) door leeftijdsgenoten in de periode die meer dan 5 jaar voor de eerste psychose ligt, is het onderwerp van deze Britse *case-control* studie. Verder werd bekeken of er verbanden zijn tussen blootstelling aan pesterijen, psychotische symptomen, cannabisgebruik en gedragsstoornis in het verleden. De EPE-patiënten (N=222) werden vergeleken met een representatieve steekproef uit de lokale bevolking (N=215), waarbij de Psychosis Screening Questionnaire (PSQ) werd afgenomen. *Bullying* werd gemeten met de Brief Life Events Schedule (BLES). Het bleek dat de EPE-patiënten significant vaker slachtoffer van pesterijen en mishandeling zijn geweest dan mensen uit de controlegroep (Adj. OR=2,28; 95%BI 1,49-3,49). Er werden geen significante interacties gevonden tussen *bullying* en cannabisgebruik of geslacht. Er was wel een sterke associatie tussen ervaringen met pesten en het hebben van een gedragsstoornis vóór het vijftiende jaar (Adj. OR=3,98). Het slachtoffer zijn van pesten lijkt ertoe bij te dragen dat personen kwetsbaarder voor psychotische stoornissen worden.