

Garcia M, Montalvo I, Creus M, Cabezas Á, Solé M, Algora MJ, Moreno I, Gutiérrez-Zotes A, Labad J. (2016). Sex differences in the effect of childhood trauma on the clinical expression of early psychosis. *Compr Psychiatry*. 68:86-96.

Er is een verband tussen emotionele en fysieke verwaarlozing in de vroege kinderjaren en de symptomen bij een vroege psychose

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat trauma's in de kinderjaren worden geassocieerd met ernstigere psychotische symptomen en slechtere cognitieve ontwikkeling bij personen die een psychotische stoornis ontwikkelen. In dit Spaanse onderzoek (79 personen met psychotische stoornis en 59 gezonde controles) werd onderzocht of er sekseverschillen zijn in het verband tussen vroege trauma's en klinische variabelen (cognitieve vaardigheden, ernst van positieve, negatieve en depressieve symptomen, middelengebruik) bij personen met een psychotische stoornis in een vroeg stadium van de ziekte (18-35 jaar). De volgende meetinstrumenten werden afgenomen: Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry; de Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS); de Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS); de Global Assessment of Functioning (GAF); de MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB); de Childhood Trauma Questionnaire (CTQ). De associaties werden berekend met behulp van multiple lineaire regressieve analyses. In vergelijking met de gezonde controles hadden degenen met een psychotische stoornis een lagere opleiding, gebruikten meer tabak en cannabis, hadden vaker een vroegkinderlijk trauma en scoorden lager op alle cognitieve domeinen. Alleen bij vrouwen werden psychopathologische symptomen geassocieerd met trauma's in de kindertijd: vrouwen met hoge CTQ-scores (met name emotionele en fysieke verwaarlozing) hadden ernstigere positieve, negatieve en depressieve symptomen, meer algemene psychopathologie en meer beperkingen in het functioneren. Hogere CTQ-scores werden geassocieerd met een lagere sociale cognitie, zowel bij mannen als vrouwen.