

*Gee B, Hodgekings J, Fowler D, Marshall M, Everard L, Lester H, Jones PB, Amos T, P Singh S, Sharma V, Freemantle N, Birchwood M. (2016). The course of negative symptom in first episode psychosis and the relationship with social recovery. Schizophr Res. 174(1-3), 165-71.*

### **Vier groepen met verschillende ontwikkeling van negatieve symptomen bij personen met een Eerste Psychotische Episode (EPE) te onderscheiden**

Er is nog weinig inzicht in de mechanismen die de ontwikkeling van en de verschillen tussen negatieve symptomen bij personen met een psychotische stoornis kunnen verklaren. In deze Britse studie werden 1006 personen met een Eerste Psychotische Episode (EPE) 12 maanden gevolgd om inzicht te krijgen in de verschillende ontwikkelingstrajecten van de negatieve symptomen en die ontwikkeling te vergelijken met de ontwikkeling van het sociale herstel. De analyses werden gedaan met behulp van Latent Class Growth Analysis (LCGA). Op baseline, na 6 en 12 maanden werden de volgende meetinstrumenten afgenomen: Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), de Time Use Survey (TUS) – om sociaal herstel te meten, de Premorbid Adjustment Scale (PAS), de Duration of Untreated Psychosis (DUP), de Calgary Depression Scale (CDSS) en de Drug Check. De factor 'negatieve symptomen' omvat de volgende items: afgestompt affect, gebrek aan spontaniteit, emotioneel teruggetrokken, passief sociaal terugtrekgedrag, moeilijk emotionele band met iemand aangaan, langzaam denken en bewegen en actieve sociale vermijding. Er werden vier latente klassen gevonden: Minimaal Afnemend (63,9% van de EPE-groep viel hier onder); Mild Stabiel (13,5%), Hoog Afnemend (17,1%) en Hoog Stabiel (5,4%). Slechts een kleine groep (5,4%) heeft permanent last van een hoge mate van negatieve symptomen. Bij een grote groep nemen de negatieve symptomen binnen 12 maanden af. Personen in de Minimaal Afnemend-groep hadden de meeste kans (43% van de groep) om na 12 maanden weer sociaal op een hoog niveau te functioneren. Een hoge mate van negatieve symptomen op baseline wordt geassocieerd met een gering sociaal herstel na 12 maanden.